



- máte oslabený imunitní systém v důsledku onemocnění nebo užívání léků, který imunitní systém negativně ovlivňuje
- máte problémy s krvácením, snadno se Vám tvoří modřiny nebo užíváte léky, které omezují srážlivost krve
- máte nyní akutní infekci, horečnaté nebo jiné závažné akutní onemocnění
- myslíte, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět

Pokud máte po konzultaci se svým praktickým lékařem pochybnosti ohledně vhodnosti očkování kvůli Vaší specifické situaci (např. vzácné onemocnění, vzácná kombinace onemocnění nebo postižení apod.), neváhejte se poradit s Vaším odborným lékařem. O výše uvedeném informujte před očkováním očkovacího lékaře.

#### **Doporučení konzultovat záměr očkování proti nemoci COVID-19 s lékařem očkovacího centra, pokud:**

- máte závažný stav nebo jinou specifickou situaci, kterou jste před očkováním konzultoval s praktickým lékařem nebo s odborným lékařem.
- jste měl(a) problémy po podání první dávky očkovací látky proti onemocnění COVID-19, jako je např. alergická reakce nebo jiná závažná nežádoucí reakce.

Pokud máte jakékoliv další otázky k očkovací látce nebo očkování, zeptejte se očkovacího lékaře.

#### **Bezpečnost podání očkovací látky a možné nežádoucí účinky očkování**

Žádná očkovací látka od žádného výrobce neobsahuje samotný virus a nemůže vyvolat onemocnění COVID-19.

#### **Bezprostřední reakce po očkování**

Závažná alergická reakce po očkování (anafylaxe) je extrémně vzácná a může nastat po jakémkoliv očkování. Někteří lidé mohou mít po podání očkovací látky alergickou reakci, která se může projevit jako svědivá vyrážka, problémy s dýcháním, otok obličeje nebo jazyka. V případě, že se u Vás taková alergická reakce vyskytne, neprodleně kontaktujte lékaře očkovacího centra. Bez včasné pomoci lékaře může dojít k újmě na zdraví, ve výjimečném případě může být pacient(ka) také ohrožena na životě. Abyste tak mohl(a) učinit, bude Vám doporučeno po očkování setrvat 30 minut na místě, kde se očkování provádí.

#### **Pozdější reakce na očkování**

Očkovací látka může vyvolat nežádoucí účinky. Pokud se vyskytnou, jsou zpravidla lehké a odezní během několika málo dní.

- U více než jednoho očkování z deseti se může vyskytnout bolest nebo otok v místě vpichu injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů nebo kloubů, zimnice nebo horečka.
- U méně než jednoho očkování z deseti se může vyskytnout zarudnutí v místě vpichu injekce nebo pocit na zvracení
- U méně než jednoho očkování ze sta se může vyskytnout zvětšení lymfatických uzlin nebo malátnost nebo jiné nežádoucí účinky.

#### **Doporučení po očkování**

##### **Bezprostředně po aplikaci očkovací látky**

Po podání očkovací látky se doporučuje pečlivé sledování Vašeho zdravotního stavu zpravidla po dobu třiceti minut, a to na místě, kde se provádí očkování. Vyvarujte se výraznější fyzické námahy dva dny po očkování.

##### **Později po aplikaci očkovací látky**

V případě, že se po očkování u Vás vyskytne některý z nežádoucích účinků, informujte lékaře očkovacího centra.

#### **Prohlášení očkované osoby**

Prohlašuji, že:

- nemám žádné známky závažnějšího infekčního onemocnění (jako jsou kašel, rýma, horečka apod.)
- nevztahují se na mne žádná karanténní opatření ve vztahu k nemoci COVID-19
- nevím o žádném důvodu, který by bránil v podání očkovací látky (např. těhotenství)
- neměl jsem v minulosti závažnou alergickou reakci či závažnější krvácivé projevy

Prohlašuji, že jsem byl(a) srozumitelně informována o veškerých shora uvedených skutečnostech a měl(a) jsme možnost klást doplňující otázky. Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení souhlasím s aplikací očkovací látky.

Datum podpisu:.....Podpis očkované osoby (zákonného zástupce).....

Razítko očkovacího centra a podpis:

PRIVAMED a.s., Kotíkovská 927/19, 323 00 Pízeň, IČ: 46885251